## DIAGNOSI DI UNA NUOVA SPECIE DI MARSUPIALE

DEL GENERE

## CHAETOCERCUS

per il Prof. W. PETERS

DIRETTORE DEL MUSEO ZOOLOGICO DI BERLINO

## Chaetocercus Bruijnii, n. sp.

Ch. capite nuchaque rufis, dorso ochraceo nigroque irrorato, prymna rufa nigroque irrorata, artubus rufis, manibus pedibusque rufofuscis; taeniis tribus nigris, media a fronte ad caudae basin, lateralibus a collo ad corporis latera extensis; pectore ventreque ochraceocanis; caudae basi rufa.

Longitudo maris ad caudae basin 0, 20; capitis 0, 056; long. auriculae, 0, 016, lat. aur. 0, 011; long. palmae c. ungue 0, 025; plantae c. ungue 0, 043.

Habitatio: Andai, Nova Guinea.

Il genere Chaetocercus fu istituito da Gerard Krefft nei Proceedings della Società zoologica di Londra (1866. p. 434.) sopra un piccolo marsupiale (C. cristicauda, p. 435. t. XXXVI) trovato presso il lago Alexandrina nel Sud dell'Australia. È quindi un fatto interessante l'aver ritrovato una seconda specie di questo genere nella parte settentrionale della Nuova Guinea.

Questa specie è dedicata al Signor A. A. Bruijn ex ufficiale nella Marina da guerra Olandese, il quale recentemente fece dono al Museo Civico di una ricca collezione d'animali della Nuova Guinea.

Berlino, 43 Giugno 4875.